

ALCOHOL CONSUMPTIE

42% Verlaagd
Leeftijd 18-34 jaar

10% Verhoogd
Leeftijd \geq 50 jaar

17% Hetzelfde gebleven
Leeftijd 35-54 jaar

MARIHUANA CONSUMPTIE

27% Verlaagd
Leeftijd 18-54 jaar

8% Verhoogd
Leeftijd 35-54 jaar

13% Hetzelfde gebleven
Leeftijd 18-54 jaar

VERHOOGDE CONSUMPTIE VAN ANDERE MIDDELEN

Tabak 29%
Phenergan 6%
Valium 5%
Akineton 4%
Ativan 1%

CRACK COCAINE CONSUMPTIE

14% Verlaagd
Leeftijd 18- \geq 55 jaar

6% Verhoogd
Leeftijd \geq 50 jaar

8% Hetzelfde gebleven
Leeftijd 35-54 jaar

REDENEN VOOR EEN VERHOOGDE CONSUMPTIE

- Het ontbreken van regelmaat
- Stress
- Verveling
- Onderbreking van de hulpverlening
- Eenzaamheid

REDENEN VOOR EEN VERLAAGDE CONSUMPTIE

- Onvoldoende mogelijkheid tot socialiseren
- De gezondheid te willen vergroten door niet te gebruiken
- Niet in staat meer te kopen vanwege de verhoogde kosten

WOONDISTRICT VAN DE RESPONDENTEN

