

Suriname Epidemiologisch Netwerk m.b.t. Drugsgebruik

Data: Periode jan-dec 2020

*Uitvoerend Bureau van de
Nationale Anti- drugs Raad*

Website: www.nar.gov.sr

FB: nationale anti-drugs raad

Tel: 424514

Onderzoeker: Mevr. S. Rootharam, MSPH, LL.B, RN

Inleiding

Het Suriname Epidemiological Network on Drug Use (SURENDU) oftewel het Suriname Epidemiologisch Netwerk met betrekking tot Druggebruik is in oktober 2004 opgericht met als doel de Nationale Anti-Drugs Raad (NAR) te assisteren bij de beleidsformulering betreffende druggebruik in Suriname. Het SURENDU-netwerk is een monitorings- en informatiesysteem dat bestaat uit twee netwerken, het Demand Reduction Drug Information Network (DDIN) en het Supply Reduction Drug Information Network (SDIN). Deze twee netwerken leveren halfjaarlijks data aan, aan het Uitvoerend Bureau van de Nationale Antidrugs-Raad (UBN) met betrekking tot resp. de vraag en aanbod van drugs. Het DDIN, bestaande uit de behandelinstellingen voor personen met een verslavingsziekte, poogt middels preventie, behandeling en begeleiding de vraag naar drugs te verminderen en het SDIN werkt aan het terugdringen van het aanbod van drugs middels politionele en justitiële samenwerking. De aangeleverde data wordt geanalyseerd en het resultaat wordt middels een rapport jaarlijks aangeboden aan de NAR en de stakeholders van de twee netwerken.

Vanwege de COVID-19 pandemie zijn behandelcenters vanaf het begin van het jaar genoodzaakt geweest geen cliënten meer op te nemen. Sommige centers hebben nog ambulante behandeling en begeleiding geboden op een laag pitje. Ten tijde van de afronding van dit rapport was de data vanuit de SDIN nog niet aangeleverd over het jaar 2020.

In dit SURENDU rapport van het jaar 2020 zijn de volgende gegevens verwerkt:

1. De demografische gegevens van de behandelde cliënten
2. Demografische factoren gedifferentieerd per primair middel en de beginleeftijd van gebruik
3. Het verschil in het gebruik bij de mannen en vrouwen

Resultaten

Analyse van de ingeleverde formulieren “OAS Standard Drug Treatment Registration Form”, van de behandelinstellingen van 2020.

Tabel 1. De behandelinstellingen en het aantal ingeleverde formulieren 2020


No.	Behandelinstellingen	Ingeleverde formulieren
1	Het Psychiatrisch Centrum Suriname: Afdeling Detoxificatie Kliniek Afdeling Polikliniek Verslavingszorg	12 60
2	Stg. Geloof en Nieuw Leven	15
3	Stg. De Stem	34
4	Stg. Victory Outreach	0
5	Stg. Liefdevolle Handen	0
	Totaal	121

1. De demografische gegevens van de behandelde cliënten

De 121 behandelde nieuwe cliënten in de vier behandelinstellingen in 2020, hadden de volgende karakteristieken (Figuur 1):

- Primair middel van gebruik: het primair middel van gebruik is het voornaamste middel waartegen de cliënten zich voor behandeling hadden aangemeld: Als primair middel van gebruik gaven de meeste cliënten crack cocaine aan: 34%,41, gevolgd door alcohol: 32%,39 en cannabis: 30%,36. 2,2% van de cliënten gaven als primair middel cocaine poeder aan, 1,1% gaf amfetamine aan, 1,1% heroïne en 1,1% gaf LSD aan.
- Geslacht: meer mannen: 93%,112 dan vrouwen: 7%,9 zijn behandeld.
- Burgerlijke status: van de cliënten waren 80%,97 in de categorie ongehuwd (ongehuwd, gescheiden, weduwe, weduwnaar) terwijl 20%,24 in de categorie gehuwd (gehuwd, samenwonend) waren.
- Opleidingsniveau: 77%,93 van de cliënten hadden geen tot een laag opleidingsniveau (afgerond/niet afgeronde Basisschool, VOJ of daaraan gelijkgestelde opleiding), terwijl 28,23% van de cliënten een middelhoog opleiding (afgerond/niet afgeronde VOS, HBO, Universitair of daaraan gelijkgestelde opleiding) hadden.

Figuur 1. De demografische gegevens van de behandelde cliënten



- Leeftijd bij aanmelding:** de meeste cliënten waren in de leeftijdscategorie 22-32 jaar: 26%,32, gevolgd door cliënten in de leeftijdscategorie 33-43 jaar: 23%,28 en cliënten in de leeftijdscategorie 44-54 jaar: 20%,24. In de leeftijdscategorie 55-65 jaar zijn 18,15% cliënten behandeld, in de leeftijdscategorie 11-21 jaar: 17,14% cliënten, in de leeftijdscategorie 66-76 jaar is 1,1% cliënt en 1 cliënt van 80 jaar behandeld.

- Werkstatus: van de cliënten hebben 32%,39 aangegeven werkenden, klein zelfstandigen of huisvrouw/-man te zijn; 42%,51 gaven aan niet werkzaam te zijn vanwege de status van student, gepensioneerden of mens met een beperking en 26%,31 gaven aan werkzoekenden te zijn.
- Secundair middel van gebruik: het secundair middel van gebruik is het 2^e middel van gebruik, naast het primair middel, waartegen sommige cliënten ook behandeling wensen. Van de 32 cliënten die antwoord gaven op deze vraag is het volgende aangegeven: 17,53% waren ook afhankelijk aan cannabis, 8,25% aan alcohol, gevolgd door 5,16% aan crack cocaine, 1,3% aan cocaine in poedervorm en 1,3% aan amfetamine.

2. Demografische factoren gedifferentieerd per primair middel en de beginleeftijd van gebruik

De drie grootste groep middelen waartegen gebruikers behandeling zochten waren cannabis, alcohol en crack cocaine (Figuur 2). Daarnaast werd in mindere mate behandeling gezocht tegen cocaine in poedervorm, amfetamine, heroïne en LSD.


- Crack Cocaine: de meeste gebruikers zochten behandeling tegen crack cocaine. De hoogste prevalentie van het gebruik lag in de leeftijdsgroep 55-65 jaar: 13,32%, gevolgd door 44-54 jaar: 11,27% en 22-32 jaar: 9,22%, waarbij de jongste cliënt 22 jaar was. Ten opzichte van de middelen cannabis (28%) en alcohol hadden de cliënten het meest een middelhoge opleiding (44%), terwijl de meeste cliënten aangaven werkloos/werkzoekenden (59%) te zijn in vergelijking met alcohol (26%) en cannabisgebruikers (19%). Minder vrouwen hebben zich aangemeld voor een behandeling tegen crack cocaine: 2/41: (5%) vergeleken met alcohol 5/39: (13%). Meer mannen hebben zich aangemeld voor behandeling tegen crack cocaine (95%) ten opzichte van alcohol (87%) en cannabis (94%).

Van de cliënten die zich hebben aangemeld tegen crack cocaine verslaving, hebben 41% crack cocaine voor het eerst gebruikt in de leeftijdscategorie 15-19 jaar, 24% in de leeftijdsgroep 20-24 jaar, 12% in de leeftijdsgroep 10-14 jaar, 10% in de leeftijdsgroep 30-34 jaar, 7% in de leeftijdsgroep 25-29 jaar en 5% in de leeftijdsgroep 35-39 jaar, waarbij het eerste gebruik op de 12-jarige leeftijd was. Gesteld kan worden dat de beginleeftijd van crack cocaine gebruik voor deze groep cliënten in de leeftijdscategorie 12-39 jaar was, waarbij de meeste cliënten crack cocaine voor het eerst gebruikt hebben in de leeftijdsgroep 15-19 jaar.

- Alcohol: de hoogste prevalentie van gebruik was in de leeftijdsgroep 33-43 jaar: 12,31%, gevolgd door 44-54 jaar: 11,28%, 22-32 jaar: 7,18%, 11-21 jaar: 4,10% en 55-65 jaar: 3,8%; hierbij was de jongste cliënt 15 jaar. Ten opzichte van de middelen cannabis en crack cocaine, waren de cliënten die zich hebben aangemeld voor behandeling tegen alcoholgebruik, het meest met geen tot een laag opleidingsniveau (100%), gehuwd (28%) en werkenden/klein zelfstandig (51%). Meer mannen (87%) dan vrouwen (13%) hebben zich aangemeld. Meer vrouwen hebben zich aangemeld voor behandeling tegen alcohol ten opzichte van cannabis en crack cocaine.

De cliënten met een alcoholverslaving hebben alcohol voor het eerst gebruikt in de leeftijdsgroepen 15-19 jaar:38%, 10-14 jaar:15% en in de leeftijdsgroep 20-24 jaar:15%, 35-39 jaar:13%, 30-34 jaar: 5%, in de leeftijdsgroep 25-29 jaar:5%, in de leeftijdsgroep 45-49 jaar:5% en in de leeftijdsgroep 40-43 jaar:3%, waarbij het eerste gebruik op de 12-jarige leeftijd was. De beginleeftijd van

Figuur 2. Differentiatie demografische gegevens per primair middel cannabis, alcohol en crack cocaine




alcoholgebruik kan aangenomen worden als te zijn in de leeftijdsgroep 12-49 jaar, waarbij de meeste cliënten alcohol voor het eerst gebruikt hebben in de leeftijdsgroep van 15-19 jaar.

- Cannabis: in Figuur 2 is te zien dat de hoogste prevalentie van cannabisgebruik in de leeftijdscategorie 11-21 jaar:13,36% en 22-33 jaar:13,36% was, gevolgd door 33-43 jaar:7,19% en 44-54 jaar:3,8%, waarbij de jongste cliënt 14 jaar was. Ten opzichte van de aanmeldingen voor behandeling tegen crack cocaine (hoogste prevalentie 44-65 jaar, 59%) en alcohol (hoogste prevalentie 33-54 jaar, 59%) lagen de cliënten met cannabisverslaving in een jongere leeftijdsklasse (hoogste prevalentie 11-32 jaar, 72%). In vergelijking met de middelen alcohol (72%) en crack cocaine (72%) waren de cliënten met cannabis verslaving het meest ongehuwd (100%). De meeste cliënten waren werkenden/klein zelfstandig (44%).
Ten aanzien van cannabisgebruik, hebben 50% cannabis voor het eerst gebruikt in de leeftijdscategorie 15-19 jaar, 22% in de leeftijdsgroep 10-14 jaar, 17% in de leeftijdsgroep 20-24 jaar, 6% in de leeftijdsgroep 30-34 jaar, 3% in de leeftijdsgroep 25-29 jaar en 3% in de leeftijdsgroep 45-49 jaar, waarbij het eerste gebruik op de 10-jarige leeftijd was. De beginleeftijd van gebruik van cannabis kan gesteld worden op 10-34 jaar, waarbij meeste cliënten cannabis voor het eerst gebruikt hebben in de leeftijdsgroep van 15-19 jaar.
- Cocaine in poedervorm: 2 cliënten hadden zich aangemeld, beiden mannen; 1 cliënt was 37 jaar (leeftijdsgroep 33-43 jaar) en 1 cliënt 57 jaar (leeftijdsgroep 55-65 jaar), beiden gehuwd en werkenden/klein-zelfstandig. 1 cliënt had een middelhoge opleiding en 1 cliënt een lage opleiding. 1 cliënt is begonnen met het gebruiken van cocaine in poedervorm op zijn 28^{ste} jaar en de andere cliënt op zijn 59^{ste} jaar.
- Amphetamine: 1 cliënt, een man van 22 jaar (leeftijdsgroep 22-32 jaar) heeft zich aangemeld, gehuwd en student met een middelhoge opleiding. De cliënt begon op zijn 18^e jaar met het gebruiken van amphetamine.
- Heroïne: 1 cliënt heeft zich aangemeld voor behandeling, een 61-jarige (leeftijdsgroep 55-65 jaar) man, ongehuwd met een middelhoge opleiding en werkzoekende. Hij begon heroïne te gebruiken op zijn 18^e jaar.
- LSD (Lysergeenzuurdi-ethylamide): een 22-jarige (leeftijdsgroep 22-32 jaar) man heeft zich aangemeld voor behandeling, gehuwd, werkende met een middelhoge opleiding. Hij begon LSD te gebruiken op zijn 20^{ste} jaar.

3. Het verschil in het gebruik bij de mannen en vrouwen

Figuur 3. Verschil in het gebruik bij mannen en vrouwen



Van de 121 cliënten waren er 112 mannen en 9 vrouwen. In Figuur 3 is te zien dat mannen zich hebben aangemeld voor behandeling tegen alle aangegeven drugsoorten, terwijl de vrouwen zich aangemeld hebben tegen cannabis, alcohol en crack cocaine. Naar verhouding van het aantal mannen en vrouwen: 112:9, hebben meer vrouwen 56%/9 dan mannen 30%/112 zich aangemeld met afhankelijkheid aan alcohol ten opzichte van de middelen crack cocaine en cannabis. Ten opzichte van de mannen (33%) waren de vrouwen het meest in de categorie werkloos/werkzoekende (56%), terwijl de mannen meer in de categorie werkende/klein-zelfstandig (42%) waren dan de vrouwen (22%). Van de 9 vrouwen hebben de meeste zich aangemeld voor behandeling in de leeftijdsgroep 44-54 jaar (44%) en van de 112 mannen hebben de meeste zich aangemeld in de leeftijdsgroep 22-32 jaar (27%). Met betrekking tot de burgerlijke status waren de vrouwen het meest ongehuwd (89%) in verhouding tot de mannen (78%). In verhouding tot de mannen (6%/112) hadden de vrouwen (22%/9) het meest een psychiatrische stoornis in combinatie met verslaving. Ten aanzien van de beginleeftijd van gebruik zijn meer vrouwen gestart met gebruiken in de leeftijdsgroep 10-19 jaar, waarbij de jongste genoteerde leeftijd 12 jaar was, terwijl de mannen het meest in de leeftijdsgroep 10-24 jaar zijn begonnen, met als jongste leeftijd 10 jaar.

Conclusie

- De meest gebruikte drug was crack cocaine, gevolgd door alcohol en cannabis; het gebruik van deze drie drugsoorten blijven hoog in de jaarlijkse data. In 2019 was het meest gebruikte drug cannabis, gevolgd door alcohol en crack cocaine (SURENDU rapport 2015-2019).
- Het aantal cliënten in de leeftijdscategorie 10-24 jaar blijft een stijgende trend tonen (SURENDU rapport 2015-2019), waarbij de beginleeftijd van gebruik 9 en 10 jaar is.
- De aanmeldingen voor behandeling tegen cocaine in poedervorm, amfetamine en heroïne vertonen geen significante veranderingen vergeleken met voorgaande jaren (SURENDU rapport 2015-2019).
- In vergelijking met data van voorgaande jaren is LSD voor het eerst gemeld in 2020.

Aanbevelingen

- Gezien de jonge beginleeftijd van drugsgebruik is dit een indicatie voor het vroegtijdig implementeren en evalueren van preventie- en interventieprogramma's. De beginleeftijd van drugsgebruik wordt beschouwd als een sleutelfactor bij de ontwikkeling en implementatie van preventieprogramma's.
- De bevindingen van deze analyse kunnen gebruikt worden om meer effectieve en gerichte bewustwordings- en voorlichtingsactiviteiten te ontwikkelen en te implementeren.
- Het is noodzakelijk om de veranderingen in de trends van drugsgebruik nauwkeurig te blijven monitoren ten behoeve van een effectieve en vroegtijdige aanpak.