

# Suriname Epidemiologisch Netwerk m.b.t. Drugsgebruik 2021

*Data: Periode jan-dec 2021*

*Uitvoerend Bureau van de  
Nationale Anti- drugs Raad*

*Website: [www.nar.gov.sr](http://www.nar.gov.sr)*

*FB: nationale anti drugs raad*

*Tel: 424514*

*Onderzoeker: Mevr. S. Rootharam, MSPH, LL.B, RN*

---

## Inleiding

Het Suriname Epidemiological Network on Drug Use (SURENDU) oftewel het Suriname Epidemiologisch Netwerk met betrekking tot Druggebruik is in oktober 2004 opgericht met als doel de Nationale Anti-Drugs Raad (NAR) te assisteren bij de beleidsformulering betreffende druggebruik in Suriname. Het SURENDU-netwerk is een monitorings- en informatiesysteem dat bestaat uit twee netwerken, het Demand Reduction Drug Information Network (DDIN) en het Supply Reduction Drug Information Network (SDIN). Deze twee netwerken leveren halfjaarlijks data aan, aan het Uitvoerend Bureau van de Nationale Antidrug-Raad (UBN) met betrekking tot resp. de vraag en aanbod van drugs. Het DDIN, bestaande uit de behandelinstellingen voor personen met een verslavingsziekte, poogt middels preventie, behandeling en begeleiding de vraag naar drugs te verminderen en het SDIN werkt aan het terugdringen van het aanbod van drugs middels politionele en justitiële samenwerking. Het DDIN levert de data aan middels het invullen van een daarvoor ontworpen formulier door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de "OAS Standard Drug Treatment Registration Form". De aangeleverde data wordt geanalyseerd en het resultaat wordt middels een rapport jaarlijks aangeboden aan de NAR en de stakeholders van de twee netwerken.

Naast de aangeleverde data van het SDIN, bevat dit SURENDU-rapport 2021 statistieken omtrent druggebruik (inclusief tabak gebruik) bij personen die zich voor het eerst hebben aangemeld voor behandeling en begeleiding bij de geregistreerde instellingen in de verslavingszorg, en presenteert bevindingen en aanbevelingen omtrent:

1. De demografische gegevens van de behandelde cliënten
2. Het primair middel en de beginleeftijd van gebruik
3. Het primair middel en geslacht
4. Het primair middel en etniciteit
5. Het primair middel gerelateerd aan het opleidingsniveau en de leeftijd van aanmelding

## Resultaten

Het Korps Politie Suriname heeft de volgende data van het SDIN ten aanzien van Drugsbestrijding aangeleverd:

**Tabel 1. Totaal landelijk in beslag genomen drugssoorten**

<u>Soort Drugs</u>	<u>Totaal 2020</u>	<u>Totaal 2021</u>	<u>Procentuele vergelijking</u>
Cocaïne(gr)	205.267,47	21.386.80,18	↑941.9%
Vloeibaar cocaïne(gr)	13.831	66.252	↑379%
Marihuana(gr)	515.296,63	203.621,73	↓ 39.5%
Hasj(gr)	2245,49	7438,23	↑60.5%
Heroïne (gr)	2,8	0	---
XTC tabletten(stuk)	680	350	↓48.5%
MDMA(gr)	254,87	92,67	↓63.6%

*Bron: Jaarverslagen BZC 2019, 2020 en 2021*

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er een stijging was in 2021 in het beslag genomen cocaine, zowel vloeibaar als niet vloeibaar (cocaine poeder, crack cocaine) en een daling in het beslag genomen marihuana (cannabis), hasj (cannabis) en methamfetaminen (MDMA: LSD, XTC, molly of sukru).

De analyse van de ingeleverde formulieren "OAS Standard Drug Treatment Registration Form", van het DDIN heeft de volgende resultaten opgeleverd:

**Tabel 2. De behandelinstellingen en het aantal ingeleverde formulieren 2021**

No.	Behandelinstellingen	Ingeleverde formulieren
1	Het Psychiatrisch Centrum Suriname: Afdeling Polikliniek Verslavingszorg	51
2	Stg. Geloof en Nieuw Leven	9
3	Stg. De Stem	35

4	Stg. Victory Outreach	10
5	Stg. Liefdevolle Handen	0
	Totaal	105


## 1. De demografische gegevens van de behandelde cliënten

De 105 behandelde nieuwe cliënten in de vier behandelinstellingen in 2021, hadden de volgende karakteristieken (Figuur 1):

- Primair middel van gebruik: het primair middel van gebruik is het voornaamste middel waartegen de cliënten zich voor behandeling hadden aangemeld: als primair middel van gebruik gaven de meeste cliënten aan cannabis: 34%,36, gevolgd door crack cocaine: 31%,33, en alcohol: 29%,30, 4% van de cliënten gaven als primair middel cocaine poeder aan en 2%,2 gaven methamphetaminen (LSD, Sukru, XTC) aan. Van de 105 cliënten, gaven 76%,80 ook aan tabak te gebruiken naast het primair middel.
- Geslacht: meer mannen: 95%,100 dan vrouwen: 5%,5 zijn behandeld.
- Burgerlijke status: van de cliënten waren 81%,85 in de categorie ongehuwd (ongehuwd, gescheiden, weduwe, weduwnaar) terwijl 19%,20 in de categorie gehuwd (gehuwd, samenwonend) waren.
- Opleidingsniveau: 89%,93 van de cliënten hadden geen tot een laag opleidingsniveau (afgerond/niet afgeronde Basisschool, VOJ of daaraan gelijkgestelde opleiding), waaronder de 5 vrouwen, terwijl 11%,12 van de cliënten een middelhoog opleiding (afgerond/niet afgeronde VOS, HBO, Universitair of daaraan gelijkgestelde opleiding) hadden.
- Leeftijd bij aanmelding: de meeste cliënten waren in de leeftijdscategorie 22-32 jaar: 26%,27, gevolgd door cliënten in de leeftijdscategorie 52-62 jaar: 23%,24 en cliënten in de leeftijdscategorie 32-42 jaar: 21%,22. In de leeftijdscategorie 42-52 jaar zijn 16%,17 cliënten behandeld, in de leeftijdscategorie 62-72 jaar 8%,8 cliënten en in de leeftijdscategorie 12-22 jaar zijn 6%,7 cliënten behandeld. De gemiddelde leeftijd bij opname bij de mannen was 41 jaar en bij de vrouwen 53 jaar. De jongste cliënt was 12 jaar en oudste 70 jaar.
- Werkstatus: van de cliënten hebben 52%,55 aangegeven werkenden, klein zelfstandigen of huisvrouw/-man te zijn; 18%,19 gaven aan niet werkzaam te zijn vanwege de status van student, gepensioneerd of mens met een beperking en 30%,31 gaven aan werkzoekenden te zijn. 4 uit de 5 vrouwen gaven aan werkzoekenden te zijn.
- Etniciteit: de meeste van de behandelde cliënten waren Creolen 40%,42, gevolgd door Hindoestanen 29%,31, Gemengd 20%,21, Marrons 4%,4, Javanen 3%,3, Inheems 1%,1, Blanke 1%,1, een Syrier 1%,1 en Chinees 1%,1.

Figuur 1. De demografische gegevens van de behandelde cliënten


## Karakteristieken van de behandelde cliënten (N=105)



## 2. Het primair middel en de beginleeftijd van gebruik


De drie grootste groep middelen waartegen gebruikers behandeling zochten waren cannabis, crack cocaine en alcohol. Daarnaast werd in mindere mate behandeling gezocht tegen cocaine in poedervorm en methamfetaminen.

Figuur 2. Beginleeftijd van cannabis gebruik




De meeste cliënten gaven aan cannabis voor het eerst gebruikt te hebben in de leeftijdscategorie 13-17 jaar, gevolgd door de leeftijdscategorie 18-22 jaar en in de leeftijd 23-27 jaar. De jongste leeftijd was 13 jaar en de oudste persoon begon op zijn 47<sup>ste</sup> jaar. De beginleeftijden van cannabisgebruik bij de vrouwen waren: 18, 25 en 30 jaar.

Figuur 3. Beginleeftijd van crack cocaine gebruik



Crack werd voor het eerst gebruikt door de meeste cliënten in de leeftijdscategorie 14-23 jaar, gevolgd door de leeftijdsklassen 24-33 jaar en 44-48 jaar, waarbij de jongste leeftijd 14 jaar en de oudste leeftijd 46 jaar was.


Figuur 4. Beginleeftijd van alcohol gebruik



De meeste cliënten gaven aan alcohol voor het eerst gebruikt te hebben in de leeftijdsklasse 16-20 jaar, gevolgd door de leeftijdsklassen 21-25 jaar, daarna 11-15 jaar en 26-30 jaar, 31-35 jaar en 36-40 jaar. De jongste leeftijd was 11 jaar en de oudste leeftijd 40 jaar. De beginleeftijden van alcoholgebruik bij de vrouwen waren: 34 en 40 jaar.

### 3. Het primair middel en geslacht


Figuur 5. Het primair middel en geslacht



De vijf vrouwen hebben zich aangemeld tegen cannabis- 60%,3 en 40%,2 tegen alcoholafhankelijkheid, terwijl de 100 mannen zich aangemeld hebben voor behandeling tegen zowel cannabis- 33%,33 als alcohol- 28%,28, maar ook crackafhankelijkheid 33%, 33 en afhankelijkheid aan cocaine poeder 4%,4 en methamphetaminen 2%,2.

#### 4. Het primair middel en etniciteit


Figuur 6. Het primair middel en etniciteit



Cliënten van Creoolse afkomst hebben zich voor het grootste deel aangemeld voor behandeling tegen cannabis gebruik 40%, gevolgd door crack 36% en daarna alcohol gebruik 21%. Het grootste deel van de Hindoestanen waren in behandeling tegen alcohol gebruik 48%, gevolgd door cannabis 29% en crack gebruik 19%. Gebruikers van Gemengde afkomst waren het meest in behandeling tegen crack cocaine 43%, gevolgd door cannabis 24%, alcohol 19% en cocaine poeder 14%. De Marrons waren in behandeling tegen cannabis en crack cocaine en de Javanen tegen cannabis. Verder waren er een Blanke voor behandeling tegen alcohol gebruik, een Syrier tegen crack cocaine gebruik, een Inheemse tegen alcohol gebruik en een Chinees tegen het gebruik van cocaine poeder.

#### 5. Het primair middel gerelateerd aan het opleidingsniveau en de leeftijd van aanmelding

Figuur 7. Het primair middel, het opleidingsniveau en de leeftijd van aanmelding



De meeste cliënten die zich hebben aangemeld voor behandeling tegen cannabisafhankelijkheid, lagen in de leeftijdsgroep 22,32 jaar, 39% en 32,42 jaar, 22% ten opzichte van de cliënten die zich aangemeld hadden tegen Crack cocaine gebruik, zij waren het meest in de leeftijdsgroep 52,62 jaar, 33%, alsook de cliënten die zich aanmeldden voor Alcohol afhankelijkheid, 52,62 jaar, 30%, waarbij de meeste cliënten geen tot een lage opleiding hadden.

Cliënten die zich aanmeldden tegen afhankelijkheid aan Cocaine in poedervorm lagen zowel in de leeftijdsgroep 22,32 jaar, 42,52 jaar als 62,72 jaar, en de cliënten die tegen methamphetaminen in behandeling waren, in de leeftijdsgroep 22,32 jaar en 42,52 jaar, waarbij allen ook een lage opleiding aangaven.

## **Conclusie**

- De meest gebruikte drug was cannabis, gevolgd door crack cocaine en alcohol bij de nieuwe aangemelde cliënten. In 2020 was het meest gebruikte drug crack cocaine, gevolgd door alcohol en cannabis (SURENDU rapport 2020). De prevalentie van deze 3 drugssoorten blijven hoog in de jaarlijkse data (SURENDU rapporten 2015-2019, 2020).
- De meeste aanmeldingen waren in de leeftijdsgroep 22-32 jaar. De jongste cliënt was 12 jaar bij aanmelding voor behandeling in 2021 en 11 jaar in 2020 (SURENDU rapport 2020). De beginleeftijd van gebruik was 11 jaar bij alcohol, 13 jaar bij cannabis en 14 jaar bij crack cocaine. In 2020 waren de meeste aanmeldingen ook in dezelfde leeftijdsgroep, terwijl de beginleeftijden van 9 en 10 jaar gemeld werden (SURENDU rapport 2020). De beginleeftijden bij de vrouwen was 18 jaar bij alcoholgebruik en 34 jaar bij cannabisgebruik.
- De aanmeldingen voor behandeling tegen cocaine in poedervorm en methamphetaminen blijven veel lager in vergelijking tot de andere gemelde drugssoorten (SURENDU rapporten 2015-2019, 2020).
- Uit de ingeleverde formulieren was ook te halen dat 4 cliënten onder behandeling waren tegen HIV/AIDS en 3 cliënten onder behandeling tegen een psychiatrische stoornis naast middelenafhankelijkheid, met name een depressieve stoornis.
- Cliënten in de leeftijdsgroep 22,32 jaar hebben zich het meest aangemeld tegen cannabisafhankelijkheid, terwijl cliënten in de leeftijdsgroep 52,62 zich het meest aangemeld hebben tegen afhankelijkheid aan crack cocaine en alcohol.

## **Aanbevelingen**

- Investeren in het vroegtijdig uitvoeren van bewustwording- en preventieprogramma's bij jongeren, gezien de jonge beginleeftijd van druggebruik in de samenleving, vooral over de gevolgen van het gebruik van cannabis, crack cocaine en alcohol.
- Investeren in onderwijs, gezien de lage opleidingsniveau van de cliënten, zodat het opleidingsniveau stijgt, dit is goed voor de maatschappelijke ontwikkeling en economische groei.
- Meer onderzoek verrichten met betrekking tot vrouwen en druggebruik.